

青海五龙沟金矿田两期蚀变作用及其找矿意义

韩玉¹⁾, 陈柏林²⁾, 邓元良¹⁾, 陈建林¹⁾, 王永²⁾, 张昊²⁾, 王铜²⁾, 李少南¹⁾, 李少平¹⁾

1) 青海省第一地质矿产勘查院, 青海平安, 810600
2) 中国地质科学院地质力学研究所, 北京, 100081

内容提要:青海五龙沟金矿田是东昆仑造山带中段最重要的金矿集中区, 区内金矿床主要受岩金沟、萤石沟-红旗沟、三道梁-苦水泉 3 条含金构造带控制。研究表明, 矿田内存在两期蚀变矿化作用, 早期是受线性断裂构造带控制的与金矿化有关的蚀变作用, 晚期是受多方向裂隙控制并与富含浸染状黄铁矿杂岩体有关的多金属矿化蚀变作用。晚期与含浸染状黄铁矿高侵位杂岩体有关的蚀变和多金属矿化吞食破坏了稍早形成的金矿床(体)。金矿找矿方向是沿线性断裂构造带, 而且没有多方向裂隙穿插, 特别是没有富含黄铁矿未变形花岗岩出露的部位, 才有可能具有金矿化。

关键词: 两期蚀变作用; 金矿化; 多金属矿化; 找矿方向; 五龙沟金矿田; 青海

五龙沟金矿田位于青海省西南部的东昆仑山地区, 行政上属青海省都兰县管辖, 为人烟和植被稀少、通行条件较差、切割极深、地貌陡峻的高寒山区。在区域构造上位于北西西向(近东西向)昆北断裂带南侧, 北接柴达木盆地东南缘(Bureau of Geology and Mineral Resources of Qinghai Province, 1991)。该区 20 世纪 80 年代初完成 1/20 万区域地质矿产调查(含物化探)时, 发现了化探异常, 90 年代初异常查证发现了五龙沟金矿(即现在的岩金沟矿床)。2006 年以来加大勘查投入, 选择红旗沟—深水潭一带采用钻、硐探工程进行攻深找盲, 发现了规模大、品位富的多条主矿体。2009 年实施了“青海省都兰县五龙沟地区金矿整装勘查”项目, 取得了金矿找矿的重大突破。20 多年来, 对五龙沟金矿田及邻区, 乃至东昆仑山地区金矿床的研究一直在持续进行, 在区域成矿构造环境、花岗岩时代、矿床成因、成矿时代、主要控矿因素、控矿构造、矿床地球化学、金矿矿物学、金矿化遥感蚀变特征等方面均取得了重要的认识(Qian Zhuangzhi et al., 1997; Shi Jinyou, 1997; Li Houmin, 1999, 2001; Zhang Dequan et al., 2001, 2007; Feng Chengyou et al., 2004; Dang Xingyan et al., 2006; Zhang Yanbin et al., 2009; Lu Lu, 2011; Zhang Yanlin 2011; Zhao Yin,

2014; Liu Jiannan et al., 2016; Liu Zhiwei et al., 2016; liu Siyu, 2016)。但是, 对于五龙沟金矿田内出现的黑石山多金属矿床未给予关注, 特别是不同构造—热液蚀变系统与金矿化的关系尚不明晰, 并已经影响了矿田范围的进一步找矿进展。本文通过详细野外地质调查, 识别出金矿田范围内两期蚀变作用, 早期为金矿化蚀变, 晚期为多金属矿化蚀变, 研究了该两期蚀变作用的特点及其对应的控矿构造, 强调了后期多金属成矿作用及其对早期金成矿作用的改造与破坏, 为矿田内的金矿找矿预测提出了新思路。

1 区域地质背景

五龙沟金矿位于青藏高原北缘, 青海省柴达木盆地南缘, 东昆仑山中段北缘地区。在大地构造位置上隶属我国中央造山带秦(北秦岭)—祁(祁连)—昆(东昆仑)晚加里东造山系(I级构造单元)之东昆仑造山带(Ⅱ级构造单元)的伯喀里克—香日德元古宙古陆块体(Ⅲ级构造单元), 北以昆北断裂带与柴达木晚中生代—新生代断陷盆地(Ⅲ级构造单元)为邻, 南以昆中断裂带与雪山峰—布尔汗布达造山亚带(Ⅲ级构造单元)分开(图 1)(Gu Fengbao, 1994; Fan Likun et al., 2009)。在区域上五龙沟金矿田位于北西西向(近东

注: 本文为中国地质调查局地质矿产调查专项(编号 12120113096000)和地质力学研究所基本科研业务费项目(DZLXJK201506)的资助成果。
收稿日期: 2015-06-14; 改回日期: 2016-01-27; 责任编辑: 周健。
作者简介: 韩玉, 男, 1985 年生。地质工程师, 主要从事矿产勘查。Email: 15997030860@163.com。通讯作者: 陈柏林, 研究员, Email: cblh6299@263.net。




图 1 五龙沟金矿田大地构造位置图(据古凤宝,1994 修改)

Fig. 1 Tectonic map of Wulonggou gold ore-field and its vicinity (after Gu Fengbao, 1994)

I—塔里木地块; II—东昆仑造山带: II₁—昆北(祁漫塔格)早古生代弧后/陆间裂谷褶皱带, II₂—昆中陆缘弧岩浆-变质杂岩带, II₃—昆南弧前俯冲杂岩带; III—巴颜喀拉海西-印支褶皱造山带; 1—主缝合带; 2—次缝合带; 3—新元古代—早古生代结合带俯冲方向, 一侧有齿者为单向俯冲, 两侧有齿者为双向俯冲; 4—晚古生代—早中生代缝合带俯冲方向; 5—A 型俯冲带

I—Tarim block; II—Eastern Kunlun orogenic zone; II₁—Early Palaeozoic arc/intracontinental rift fold belt in Northern Kunlun (Qimantag), II₂—epicontinental arc magma-metamorphism complex rock belt in central Kunlun, II₃—subduction zone of complex rock in front of southern Kunlun; III—Bayanhar Hercynian-Indosinian fold-orogenic zone; 1—main suture zone; 2—secondary suture zone; 3—direction of contact zone of Late Proterozoic-Early Palaeozoic, the line with hackly in one side is single direction subduction, the line with hackly in two side is double direction subduction; 4—the direction subduction of Late Paleozoic-Early Mesozoic suture zone; 5—amperfer-type subduction zone

西向)昆北断裂南侧,昆中断裂带北侧。在矿产区划上属于昆北成矿带内的南部,其南侧依次是昆南成矿带、巴颜喀拉成矿带(Lu Lu,2011)。

2 矿田地质概况

2.1 矿田地层岩石

五龙沟金矿田处于东昆仑中部构造带,矿田内构造线呈 NW 向,主体由 3 条 NW 向近平行展布的构造带和 4 个轴向呈 NW 向延伸的褶皱构成。它们奠定了本区基本构造格架(Qian Zhuangzhi et al.,1997,1998;Zhang Yanlin et al.,2011)。

矿田内地层为古元古界金水口群、长城系小庙组和青白口系丘吉东沟组,零星出露奥陶系祁漫塔格群(图 2)。金水口群以含堇青石黑云斜长片麻岩为主,次为含堇青石黑云斜长片岩、石英片岩、二长片麻岩和斜长角闪岩夹大理岩。小庙组主要为黑云斜长片麻岩、黑云石英片岩夹少量大理岩,是经历了低角闪岩相变质的一套火山-沉积岩系,碎屑锆石年代学证实其形成时代为 1683~1554 Ma(Chen Youxin et al.,2011; Guo Xianqing et al.,2016)。丘吉东沟组下部为片岩、砾岩段,主要由片理化变质砾岩、砂岩、千枚岩夹大理岩组成,与下伏小庙组呈角度不整合接触关系;上部为变火山岩段,由片理化凝灰质、硅质板岩,变火山碎屑岩等组成。丘吉东沟

组具丰富的叠层石和微古植物组合,形成时代为新元古代中—晚期,属浅海相沉积(Zhang Yanlin et al.,2011)。

矿区岩浆岩以侵入岩为主,形成时代以新元古代、早古生代、晚古生代和早中生代为主(图 2)。早古生代侵入岩构成区内侵入岩的主体,主要包括砖红色-肉红色粗粒正长花岗岩、灰白色中粒正长花岗岩和少量闪长岩,LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄介于 450~410 Ma 之间,部分 A 型花岗岩年龄为 390 Ma 左右(Lu Lu,2011;Zhang Jinyang et al.,2012; Liu Bin et al.,2013)。早中生代侵入岩主要为浅成岩体,主要岩石类型为灰白色花岗闪长斑岩和灰绿色—浅色闪长玢岩脉,LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄约为 220 Ma(Lu Lu,2011)。

2.2 矿田构造概况

五龙沟金矿田内断裂构造十分发育,具一定规模的有 59 条,按断层走向可划分为 6 组:NNW 向、NW 向、NNW 向、SN 向、NE 向和近 EW 向(图 2)。其中 NNW 向断层组主要分布于岩金沟、红旗沟、苦水泉一带,分别集中成带,构成岩金沟断裂破碎带、萤石沟-红旗沟断裂破碎带、三道梁-苦水泉断裂破碎带。NNW 断裂近于平行展布,规模大,纵贯全区,单条断裂出露长度达 6~20 km,是区域最早形成的主干断裂构造,也是区内最重要的导矿、容矿构造带。




图 2 五龙沟金矿田地质构造略图

Fig. 2 Geological structure sketch map of Wulonggou gold ore-field

1—第四系冲洪积;2—丘吉东沟组;3—长城系小庙组;4—金水口岩群;5—晚三叠世钾长花岗岩;6—早华力西期黑云母二长花岗岩;7—早华力西期蚀变斜长花岗岩;8—早加里东期黑云花岗闪长岩;9—新元古代黑云花岗闪长岩;10—新元古代含暗色包体花岗岩;11—新元古代石英闪长岩;12—基性岩脉;13—黑云母花岗岩脉;14—地质界线;15—不整合界线;16—实推测正断层;17—实推测逆断层;18—韧性剪切带;19—金矿床(点);20—多金属矿点及分布界线;21—含金蚀变带及编号

1—Quaternary alluviation diluvium; 2—Qiuji Donggou Formation; 3—Xiaomiao Fomation of Changcheng System; 4—Jinshuikou Group; 5—Late Triassic potash feldspar granite; 6—Early Variscan biotite monzonitic granite; 7—Early Variscan altered plagiogranite; 8—Early Caledonian granodiorite; 9—Late Proterozoic biotite granodiorite; 10—late Proterozoic melaenclosure granite; 11—late Proterozoic quartz diorite; 12—basic dike; 13—biotite granite dike; 14—geological boundary; 15—discordance boundary; 16—measured normal fault; 17—measured reverse fault; 18—ductile shear zone; 19—gold deposit; 20—polymetallic deposit & distribution boundary; 21—alteration zone included gold & the numbering

3 两种蚀变矿化类型的识别

在上世纪 90 年代初发现岩金沟金矿床以来,对五龙沟金矿田的蚀变也开展了相关研究(Shi Jinyou, 1997; Li Houmin et al., 2001; Zhang Dequan et al., 2001; Feng Chengyou et al., 2004; Zhang Yanbin et al., 2009; Lu Lu, 2011; Zhang Yanlin et al., 2011),但相对于找矿进展、矿床成因

和矿田内岩浆岩年代学研究,矿田内的蚀变类型研究显得非常薄弱,只是笼统地分析蚀变与金矿化的关系。然而 2012 年以来,沿 NWW 走向构造破碎带中褐铁矿化、黄钾铁矾化非常发育的区段的金矿找矿工作却遇到了困难,例如在中支沟北叉沟、黄铁矿沟等处虽然投入较大勘查工作量,但是金矿找矿进展不大。

岩金沟、萤石沟-红旗沟、三道梁-苦水泉 3 条断

裂破碎带是作为含金矿化蚀变带而著称的,但是野外地质调查发现 3 条控矿构造带不同区段蚀变类型和矿化类型存在明显差异,或者说 3 条带沿走向不是都有良好的金矿化,有的具有多金属矿化。

3.1 岩金沟矿带不同区段矿化差异

岩金沟带是五龙沟地区发现最早的金矿带,于 20 世纪 90 年代初发现并断续开发至今。由 I、II、III、IV、V、VI 等矿化带组成,其中 II、III、IV 号带规模较大。该带总体呈 NW 走向(南段 320° 、中段 310° 、北段 300°),有向南东收敛、向北西撒开的似帚状构造形态。金矿化以受 F_{12} 控制的 III 号带最好,达到中型金矿床规模。

III 号金矿带围岩以黑云斜长片麻岩为主,少量为黑云母片岩、花岗岩及花岗闪长岩。III 号金矿带按空间展布可分为 3 段,东西向沟北侧为北西段、沟南侧至山梁为中段、山梁南侧为南东段。中段金矿化最好,蚀变分带清楚,从两侧向中心依次是黑云斜长片麻岩、黄铁矿化(地表氧化为褐铁矿化)黑云斜长片麻岩、白云母化高岭土化黄铁矿化强蚀变片麻岩、强硅化黄铁矿化毒砂化蚀变岩或者含黄铁矿毒砂石英脉(高品位金矿石)(图 3a)。出现较多高品位金矿石,最主要的高品位金矿石是含细晶黄铁矿和微晶针状毒砂的石英脉型(单样最高达 110g/t),或者由含细晶黄铁矿和微晶针状毒砂的石英质胶结蚀变片麻岩角砾形成的角砾岩型(图 3b)。高品位金矿石出现于矿化蚀变带中心,两侧为低品位金矿石(蚀变岩型)。

南东段北部金矿化较好,蚀变分带清楚(图 3c、d),以 PD3600 为代表,发育强蚀变岩,向南金矿化逐渐变贫。

而从岩金沟北西段起,出现另一类蚀变矿化,最典型的是黑石山矽卡岩型铅锌多金属矿床;在岩金沟下游北侧的八路沟和沙丘沟一带,除了矽卡岩型多金属矿床,还发育石英方解石脉型多金属矿床。在多金属矿化区段,蚀变带方向性不明显;这些多金属矿化蚀变一部分岩沿控制金矿带的线性构造带发育,另一部分则发育在其他方向的断裂裂隙中(图 3e、3f)。

3.2 萤石沟-红旗沟矿带不同区段矿化差异

萤石沟-红旗沟矿化蚀变带是目前五龙沟地区金矿化最好的矿带,也是目前五龙沟地区最主要的勘查区带和金矿开发产区段。由 VII、VIII、IX、X、XI 等矿化带组成,其中 XI 号金矿带是本矿化蚀变带的主矿带,具有规模大、延伸长的特点,是本带乃至整个

五龙沟地区的最主要矿带,该带总体呈 NW 走向(南段哈西洼—百吨沟一带为 $330^{\circ}\sim 340^{\circ}$ 、中北段 $290^{\circ}\sim 310^{\circ}$)。VII、IX 号矿带在红旗沟一带金矿化良好,也是目前主要勘查和开发的金矿带。

VII 号和 IX 号金矿带出露于红旗沟、黑石沟、淡水沟、石灰沟、黄铁矿沟、龙潭沟、石涧沟、断层沟、萤石沟。以黄龙沟为界东西两段矿化存在明显差异。VII 号和 IX 号金矿带围岩以黑云斜长片麻岩、黑云石英片岩和片麻状花岗岩为主,西段出现少量大理岩、板岩等。

VII 号和 IX 号金矿带石灰沟以东的东段金矿化较好,民采坑硐较多。在红旗沟 IX 号金矿带表现沿线性断裂构造发育的褐铁矿化和黄钾铁矾化(图 4a),局部发育石英脉,而且石英脉产状倾角缓于构造变形的面理,反映构造变形为逆冲的运动学特点。同样在淡水沟 IX 号金矿带仍然具有明显的沿线性断裂发育的矿化蚀变分带,地表范围已被采空(图 4b),目前深部仍在开采中。

VII 号和 IX 号金矿带石灰沟以西的西段,金矿化明显变弱,以黄铁矿沟为典型。在黄铁矿沟东西两侧坡上,虽然控制 VII 号金矿带的断裂构造还有出露,并且具有线性延伸特点,但是出露了另一套沿多个方向的次级裂隙、或者呈面状发育褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变(图 4c、d、e、f)。由于该类褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变沿多个方向发育,显得非常混乱,导致勘查工程部署出现困难,出现“门”字形探槽(图 4f)。

结合地表地质调查发现,在黄铁矿沟东坡 VII 号矿带出露位置及其北侧,出露出一套富含黄铁矿的花岗闪长岩杂岩体,由石英闪长岩、二长闪长岩、花岗闪长岩等组成,其最主要的特点是含有较多的浸染状黄铁矿,在 W 154 点及其北侧有比较多的出露(图 4e)。一般黄铁矿含量为 1% 左右,个别可达 2%~3%,据 PD3200 平硐揭露,极个别花岗闪长岩黄铁矿含量可高达 5%。据现有勘查资料显示,黄铁矿沟金矿化比较弱,基本没有成型的金矿体,PD3200 平硐揭露到的 VII 号带也仅有 0.6g/t 的金品位。

XI 号金矿带南东起于百吨沟,经哈西洼、石灰沟脑、小泉沟、三窝水沟、红旗沟南段、黑石沟口、黄龙沟、水闸东沟,过五龙沟主沟,沿水闸西沟、龙潭沟、石涧沟、断层沟,到萤石沟。以水闸西沟与龙潭沟东侧山脊为界,矿化存在明显差异。

与 VII 号和 IX 号金矿带完全不同, XI 号金矿带围岩非常复杂,除了黑云斜长片麻岩和片麻状花岗岩外,还有花岗质糜棱岩、炭质板岩、凝灰质板岩、灰岩、泥




图 3 岩金沟Ⅲ号矿带构造蚀变分带宏观特征

Fig. 3 Picture showing macro-structure and alteration of mineralization belt Ⅲ in Yanjin'gou

(a) —Ⅲ号矿带中段宏观特征,矿化蚀变带发育于黑云斜长片麻岩中,蚀变宽度 10~30m,构造破碎带呈线性延伸,具有负地形地貌,控矿构造带外蚀变和变形都非常弱;(b) —Ⅲ号矿带角砾状富金矿石特点,角砾为蚀变花岗岩、胶结物为含微细粒状黄铁矿、针状毒砂的硅化、方解石化交代蚀变物质,局部交代较彻底,形成团块状、不规则脉状构造,手标本照片;(c) —Ⅲ号矿带南段宏观特征,矿化蚀变带发育于花岗质片麻岩中,蚀变宽度 19m,两侧弱蚀变带各约 8m,中间强蚀变带约 3m,弱蚀变带外花岗质片麻岩未发生蚀变,也没有发生构造变形;(d) —图 c 的局部放大,Ⅲ号矿带南段强蚀变带特点,以强白云母(绢云母)化、低温硅化、泥化、高岭土化为特征。低温硅化石英脉中见细粒黄铁矿、针状毒砂;(e) —Ⅲ号矿带北西段宏观特征,沿多个方向发育褐铁矿化和黄钾铁矾化;(f) —黑石山多金属矿的黄钾铁矾化和褐铁矿化,呈不规则状分布,其中黄钾铁矾化比含金构造带中更明显

(a) —the macroscopic characteristics of Ⅲ ore-belt, where the alteration (10~30m wide) showing linear structure and negative landform mainly developed in biotite plagioclase gneiss, while there is little mineralization and alteration outside this belt; (b) —a handspeciman showing the characteristics of breccia-type gold ore in the Ⅲ ore-belt, where the rubble is the altered granite and the cement is the silicified and calcited rock with fine pyrite and acicular arsenopyrite, massif structure and vein ore occur where the metasomatism alteralization is complete; (c) —the structural characteristics in southern part of Ⅲ ore belt, where alteration belt (19m wide) developed in granitic gneiss along the NWW-trending fault, including 8m width weakly alteration belts in both side and 3m width strongly alteration belt in the center, while there is no alteration outside this belt; (d) —an enlarged part in picture (c) showing the muscovitization (sericitization), low-temperature silicification, argillification and kaolinization in this belt, and fine pyrite with acicular arsenopyrite occur within some low-temperature silicification quartz vein; (e) —the alteration in northwestern part of Ⅲ ore belt which are characterized by widespread and well-developed limonitization and jarositation along fracture zone in different direction; (f) —quite irregular limonitization and jarositation in Heishishan polymetallic ore, and the jarositation is stronger than that in Au-bearing structure zone in the middle part and southern part of Ⅲ ore belt




图 4 IX 号和Ⅶ 含金构造带构造蚀变宏观特征

Fig. 4 Picture showing macro-structure and alteration of IX and Ⅶ Au-bearing mineralization belt

(a) —IX 号矿带红旗沟上段宏观特征, 围岩为黑云斜长片麻岩, 蚀变分带明显, 石英脉缓于变形面理, W09 点; (b) —IX 号矿带淡水沟上段矿带采空区, 围岩为黑云母石英片岩, 矿体顶底板较明显, 含矿断裂具有逆冲的运动学特征, W144 点; (c) —Ⅶ 号矿带黄铁矿沟西坡蚀变分布特征, 褐铁矿化和黄钾铁矾化除沿主断裂发育外, 还沿多个方向的次级裂隙发育, W153 点及其附近; (d) —Ⅶ 号矿带黄铁矿沟东坡蚀变分布特征, 褐铁矿化和黄钾铁矾化除沿主断裂发育外, 还沿多个方向的次级裂隙发育, W154~W156 点一带; (e) —黄铁矿沟东坡含黄铁矿花岗闪长岩及其沿多方向的次级裂隙或面状发育褐铁矿化和黄钾铁矾化, W154 点北侧; (f) —黄铁矿沟西坡脚沿多方向次级裂隙发育的褐铁矿化和黄钾铁矾化, 勘查工程探槽呈“门”字形部署, W153 点东

(a) —W09 showing the characteristics of IX ore—belt in Hongqigou gold deposit, in which the wall—rock is biotite plagioclase gneiss with well alteration zonation and the foliation dips more steeply than quartz vein; (b) —W144 showing the goaf of IX ore-belt in Danshuigou gold deposit, where wall-rock is biotite quartz schist and the boundary of ore-body which controlled by thrust fault is clear; (c) —the characteristics of alteration distribution of VII ore-belt in the western slope of Huangtiekuanggou (W153 and its adjacent area), the well-developed limonitization and jarositization occur along either the main fault or secondary fault in different direction; (d) —the characteristics of alteration distribution of VII ore-belt in the eastern slope of Huangtiekuanggou (W154-W156), the well-developed limonitization and jarositization occur along either the main fault or secondary fault in different direction; (e) —the limonitization and jarositization within pyritiferous granodiorite develop either along the secondary fault or as planar in the eastern slope of Huangtiekuanggou (the north of W154); (f) —well-developed limonitization and jarositization along the secondary fault in different direction in the western basal slope of Huangtiekuanggou (the east of W153), and the exploratory trenches resemble the Chinese character of “门”

灰岩、砾岩、含砾砂岩、超基性岩及安山质火山岩等。

Ⅺ号金矿带在水闸东沟东段和黄龙沟一带具有最好的金矿化,是目前金辉矿业的主采区,向东黑石沟矿段、深水潭矿段金矿化也较好,南段百吨沟和哈西洼一带也有不错的金矿化显示。向西在水闸东沟的西段金矿化逐渐变弱,在水闸西沟口金矿化较弱,而龙潭沟则是 2014 年的重点工作区之一(图 5)。

在龙潭沟一带Ⅺ号金矿带出露位置及其北侧附近,出露富含黄铁矿的花岗闪长岩杂岩体,其最主要的特点是含有较多的浸染状黄铁矿,风化后形成大面积褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变,部分沿控制Ⅺ号金矿带的断裂构造发育,更多的是沿其他方向的次级裂隙发育,因而地表形成较大范围的褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变(图 5)。

野外地质调查显示,在龙潭沟东西两叉沟之间的小山梁上(W165 点及其南侧)可以发现两期特点明显不同的花岗岩,在 165 点位出露早期花岗岩,该花岗岩已经发生了明显的韧性构造变形,形成片麻状和糜棱状构造,糜棱岩面理产状为 $298^{\circ}/SW84^{\circ}$ 。向南依次出露大理岩夹泥岩、泥灰岩,距 W165 点约 50m 处,出露褐铁矿化花岗岩,该花岗岩没有发生构造变形,而且具有明显后期侵入接触关系。

在龙潭沟西叉沟及断层沟一带沿控制Ⅺ号金矿带的主断裂及其北侧的次级裂隙发育较多的褐铁矿化和黄钾铁矾化,野外观察发现这些蚀变是由没有发生构造变形的含黄铁矿花岗岩风化形成的(图 5)。

3.3 三道梁-苦水泉带东段不同区段矿化差异

三道梁-苦水泉矿化蚀变带在中支沟口和五龙沟主沟西侧的断壕沟口一带有比较好的金矿化(图 2、图 6a)。然而在中支沟北叉沟的Ⅺ号带,虽然发育广泛的褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变,但是没有明显的金矿化,野外观察可见主要是含黄铁矿中粗粒花岗岩(花岗闪长岩),而且蚀变不仅仅沿主断裂发育,也沿其他方向次级裂隙发育,或者不规则状发育(图 6b、c、d)。

4 两种蚀变矿化的特点与成因

4.1 两种蚀变矿化的特点

综合分析可以看出,黄铁矿沟Ⅶ号带、中支沟北叉沟Ⅺ号带和龙潭沟一带Ⅺ号带发育两种矿化蚀变,一种为金矿化,另一种为多金属矿化,它们具有不一样的特点:第一,与金矿化有关的蚀变受线性断裂构造控制(图 2);与多金属矿化有关的蚀变不是沿线性延伸的主断裂分布,而是沿多方向的次级裂隙分布甚至是面状的,少部分穿插发育在控制金矿化的线性主断裂带中,并破坏已经形成的金矿化。第二,与金矿化有关的蚀变发育于片麻岩、片麻状花岗岩等中,岩石多数发生了一些构造变形;而与多金属矿化有关的蚀变发育于含较多浸染状黄铁矿的花岗岩或花岗闪长岩(二长闪长岩)中,岩体没有发生构造变形。第三,发育多金属矿化蚀变的含浸染状黄铁矿的花岗杂岩往往与所在金矿化带中的发生过




图 5 龙潭沟—断层沟一带Ⅺ号矿化带构造蚀变宏观特征

Fig. 5 Picture showing macro-structure and alteration of Ⅺ mineralization belt in Longtangou-Duancenggou




图 6 中支沟Ⅻ号矿化带构造蚀变宏观特征

Fig. 6 Picture showing macro-structure and alteration of Ⅻ mineralization belt in Zhongzhigou

(a)一五龙沟主沟西侧断壕沟口,呈线性发育的控制金矿化的断裂破碎带,具硅化、绢云母化和微细黄钾铁矾化,W58点;(b),(c),(d)一支沟北叉沟Ⅻ号矿带,含黄铁矿中粗粒花岗岩中发育不规则状褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变,宽度很大,金矿化弱,位置为W97、W97点西和W98点西

(a)—W58 in the outlet of Duanhaogou of the west side of the main Wulonggou, showing the silicification, sericitization and fine jarositization develop along the lined fault fracture zone which controls the gold mineralization; (b)、(c)、(d)—picture from W97, the west of W97 and the west of W98 in the XII ore belt of the north branching valley of Zhongzhigou, showing the limonitization and jarositization widely occur as irregular planer and within the medium-macro grained undeformed pyritiferous granite, accompanying weakly gold mineralization

构造变形的岩石具有明显的侵入接触关系。第四,在蚀变类型上,与金矿化有关的蚀变以绢云母化、硅化为主(图 3a、b、c、d,图 4a、b),而与多金属矿化有关的蚀变主要发育黄铁矿化(风化后为褐铁矿化和黄钾铁矾化)(图 3e、f,图 4c、d,图 5)。第五,在蚀变矿物粒度上,与金矿化有关的蚀变矿物粒度细小,一般 1mm 以下,而与多金属矿化有关的蚀变矿物粒度大,一般 2~3mm,个别达 5mm 以上。第六,已有勘查工程显示,黄铁矿沟Ⅶ号带、中支沟北叉沟Ⅻ号带往往有铅锌多金属矿化,而金矿化较差。

4.2 两种蚀变矿化的成因

考虑到研究区内黑石山矽卡岩型多金属矿的存在,引起矽卡岩蚀变的侵入岩也是花岗闪长岩,并且在黑石山北侧的八路沟和沙丘沟一带的矿化也是受沿多方向裂隙构造以及岩体构造控制,发育了褐铁矿化、黄钾铁矾化以及脉状含黄铁矿闪锌矿方解石石英脉的事实,我们认为黄铁矿沟Ⅶ号带、中支沟北叉沟Ⅻ号带大面积的褐铁矿化和黄钾铁矾化蚀变不是受线性断裂构造控制,也与金矿化蚀变无关,而是属于另一类型的矿化蚀变作用,是含较多浸染状黄

铁矿的花岗岩或花岗闪长岩(二长闪长岩)氧化形成的,与铅锌多金属矿化存在一定关系。同时根据该含黄铁矿花岗岩的侵入接触关系、铁闪锌矿为主的较高温矿物组合,说明该期成矿作用有关的岩浆岩属于高侵位岩体,其形成应该晚于金成矿作用。而本区金矿床为细粒黄铁矿、针状毒砂、辉锑矿、不可见微细金矿物等说明金成矿作用为低温条件,与金矿有关的岩浆岩为低侵位岩体,还被埋藏深处;多金属矿化作用可能在一些地段是对已经形成的金矿床起破坏作用。

5 主要结论及其地质找矿意义

五龙沟金矿田位于东昆仑造山带中段,区内金矿床主要受岩金沟、萤石沟-红旗沟、三道梁-苦水泉三条含金构造带控制。研究表明,矿田内存在两期蚀变矿化作用,早期是受线性断裂构造带控制的与金矿化有关的蚀变作用,晚期是受多方向裂隙控制并与富含浸染状黄铁矿的杂岩体有关的多金属矿化蚀变作用。晚期的含浸染状黄铁矿高侵位杂岩体吞食破坏了稍早形成的金矿床(体)。

根据本区存在两种蚀变矿化作用的特征,笔者研究团队在2014年第一次野外工作结束之际(2014年7月11日),与青海第一地质矿产勘查院五龙沟野外分队进行了交流,并提出正在进行勘查工程的龙潭沟一带Ⅺ号带与黄铁矿沟Ⅶ号带、中支沟北叉沟Ⅻ号带及八路沟和沙丘沟一带具有相似的蚀变,也存在含浸染状黄铁矿花岗杂岩体以及相类似的蚀变特点,属于与多金属矿化有关的蚀变类型,因此不会有太好的金矿化。在第二次野外工作时(2014年10月22日),从野外分队获悉,龙潭沟一带Ⅺ号带2014年普查工作已经结束,勘查工程见及少量多金属矿化,但是金矿化微弱,笔者7月份的预测得到了验证。

References

- Bureau of Geology and Mineral Resources of Qinghai Province. 1991. Regional geology of Qinghai Province. Beijing: Geological Publishing House, 1~662 (in Chinese with English abstract).
- Chen Youxin, Pei Xianzhi, Li Ruibao, Liu Zhanqing, Li Zuochen, Zhang Xiaofei, Chen Guochao, Liu Zhigang, Ding Sanping and Guo Junfeng. 2011. Zircon U-Pb age of Xiaomiao Formation of Proterozoic in the eastern Section of the East Kunlun orogenic belt. *Geoscience*, 25(3): 510~521 (in Chinese with English abstract).
- Dang Xingyan, Fan Guizhong, Li Zhiming, Li Zhiming, Fan Xiaohua and Gu Ying. 2006. Typic deposit analysis in the Eastern Kunlun Area, NW China. *Northwestern Geology*, 39(2): 143~155 (in Chinese with English abstract).
- Fan Likun, Cai Yanping, Liang Haichuan, Li Honglu. 2009. Characters and evolution of the geodynamics in the Eastern Kunlun. *Geological Survey and Research*, 33(3): 181~186 (in Chinese with English abstract).
- Feng Chengyou, Zhang Dequan, Wang Fuchun, Li Daxin and She Hongquan. 2004. Multiple orogenic processes and geological characteristics of the Major orogenic gold deposits in east Kunlun area, Qinghai Province. *Acta Geoscientia Sinica*, 25(4): 415~422 (in Chinese with English abstract).
- Gu Fengbao. 1994. Geological characteristics of East Kunlun and tectonic evolution in Late Palaeozoic-Mesozoic Era. *Qinghai Geology*, 9(1): 4~14 (in Chinese with English abstract).
- Guo Xianqing, Yan Zhen, Fu Changlei, Wang Zongqi. 2016. Formation age and tectonic attribute of Jinshuihou Group complex in the Nanshan area, Qinghai. *Acta Geologica Sinica*, 90(3): 589~606 (in Chinese with English abstract).
- Li Houmin, Hu Zhengguo, Qian Zhuangzhi, Liu Jiqing, Yan Zhen and Sun Jidong. 1999. The preliminary recognition of the main gold and polymetallic metallogenic system in East Kunlun Mountains. *Journal of Xi'an Engineering University*, 21(4): 51~56 (in Chinese with English abstract).
- Li Houmin, Shen Yuanchao, Hu Zhengguo, Qian Zhuangzhi. 2001. Minerogenetic mechanism and condition of Wulonggou gold deposit in East Kunlun Mountains, Qinghai Province. *Geology and Prospecting*, 37(1): 65~69 (in Chinese with English abstract).
- Liu Bin, Ma Changqian, Guo Pan, Zhang Jinyang, Xiong Fuhao, Huang Jian and Jiang Hong'an. 2013. Discovery of the Middle Devonian A-type granite from the Eastern Kunlun orogen and its tectonic implications. *Earth Science-Journal of China University of Geosciences*, 38(5): 947~962 (in Chinese with English abstract).
- Liu Jiannan, Feng Chengyou, Xiao Keyan, He Shuyao, Li Daxin, Zhao Yiming. 2016. Mineralization characteristics and resource potential analysis of the East Kunlun metallogenic belt. *Acta Geologica Sinica*, 90(7): 1364~1376 (in Chinese with English abstract).
- Liu Siyu. 2016. The Geological Characteristics of the Dachang Gold Deposit in Qumalai, Qinghai Province. *Geological Review*, 62(S1): 121~122.
- Liu Zhiwei, Zhao Wenjin, Wu Zhenhan, Shi Dalian. 2016. An evidence of ocean crust subduction from deep reflection seismic data in East Kunlun orogeny. *Acta Geologica Sinica*, 90(8): 1692~1702 (in Chinese with English abstract).
- Lu Lu. 2011. Study on the ore-controlling structure of Wulonggou gold deposit in East Kunlun Mountain. Master's thesis of Chinese Academy of Geological Sciences (in Chinese with English abstract).
- Qian Zhuangzhi, Hu Zhengguo, Liu Jiqing. 1998. Northwest ductile shear zones and their tectonic setting in the East of Kunlun Mountains. *Journal of Chengdu University of Technology*, 25(2): 201~205 (in Chinese with English abstract).
- Qian Zhuangzhi, Li Houmin, Hu Zhengguo. 1997. Study of structures controlling gold deposits in Wulonggou areas, Qinghai Province. *Journal of Xi'an College of Geology*, 19: 27~32 (in Chinese with English abstract).
- Shi Jinyou. 1997. Geological features and prospecting criteria of Wulonggou gold deposit of Dulan County, Qinhai Province. *Progress in Precambrian Research*, 20(2): 29~36 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Dequan, Feng Chengyou, Li Daxin, Xu Wenyi, Yan Shenghao, She Hongquan, Dong Yingjun and Cui Yanhe. 2001. Orogenic gold deposits in the North Qaidam and East Kunlun Orogen, West China. *Mineral Deposits*, 20(2): 137~146 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Dequan, Wang Fuchun, She Hongquan, Feng Chengyou, Li Daxin, Li Jinwen. 2007. Three-order ore-controlling structural system of orogenic gold deposits in the Northern Qaidam margin-East Kunlun region. *Geology in China*, 34(1): 92~100 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Jinyang, Ma Changqian, Li Jianwei. 2012. Visible gold-forming environment evidenced by sulfide mineralogical characteristics of Shuizhadonggou-Huanglonggou gold deposit in eastern Kunlun orogen. *Mineral Deposits*, 36(6): 1184~1194 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Yanbin, Zhong Kanghui, Yi Guihua, Ma Hui. 2009. The extraction of remote sensing geological information and metallogenic prediction of gold mineralized concentrate district in Wulonggou, East Kunlun Mountains. *Geology and Exploration*, 45(4): 444~449 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Yanlin, Han Yu, Zhang Peiqing, Tian Chengsheng and Chen Jianlin. 2011. Characteristics and prospecting potential of gold

mineralized zone XI in Wulonggou gold deposit, eastern Kunlun. Gold, 32(9): 9~15 (in Chinese with English abstract).

Zhao Yin. 2014. The geological characters and genesis of the WuLongGou deposit in Qinghai Province. Science & Technology Information, 11:115~119(in Chinese with English abstract).

参 考 文 献

- 陈有炳,裴先治,李瑞保,刘战庆,李佐臣,张晓飞,陈国超,刘智刚,丁仁平,郭俊峰. 2011. 东昆仑造山带东段元古界小庙岩组的锆石 U-Pb 年龄. 现代地质, 25(3): 510~521.
- 党兴彦,范桂忠,李智明,范晓华,顾英. 2006. 东昆仑成矿带典型矿床分析. 西北地质, 39(12): 143~155
- 范丽琨,蔡岩萍,梁海川,李宏录. 2009. 东昆仑地质构造及地球动力学演化特征. 地质调查与研究, 33(3): 181~186.
- 丰成友,张德全,王富春,李大新,余宏全. 2004. 青海东昆仑复合造山过程及典型造山型金矿地质. 地球学报, 25(4): 415~422.
- 古凤宝. 1994. 东昆仑地质特征及晚古生代—中生代构造演化. 青海地质, 9(3): 4~14.
- 郭现轻,闫臻,付长全,王宗起. 2016. 青海南山“金水口岩群”的时代与构造属性研究. 地质学报, 90(3): 589~606.
- 李厚民,沈远超,胡正国,钱壮志. 2001. 青海东昆仑五龙沟金矿床成矿条件及成矿机理. 地质与勘探, 37(1): 65~69
- 李厚民,胡正国,钱壮志,刘继庆,闫臻,孙继东. 1999. 对东昆仑金及多金属主要成矿系列的初步认识. 西安工程学院学报, 21(4): 51~56.
- 刘彬,马昌前,郭盼,张金阳,熊富浩,黄坚,蒋红安. 2013. 东昆仑中泥盆世 A 型花岗岩的确定及其构造意义. 地球科学(中国地质大学学报), 38(5): 947~962.
- 刘建楠,丰成友,肖克炎,何书跃,李大新,赵一鸣. 2016. 东昆仑成矿

- 带成矿特征与资源潜力分析. 地质学报, 90(7): 1364~1376.
- 刘思宇. 2016. 青海省曲麻莱县大厂金矿床成矿地质特征. 地质论评, 62(S1): 121~122.
- 刘志伟,赵文津,吴珍汉,史大年. 2016. 东昆仑造山带中地壳存在古洋壳俯冲的深反射地震证据. 地质学报, 90(8): 1692~1702.
- 陆露. 2011. 东昆仑五龙沟金矿构造控矿特征研究. 北京: 中国地质科学院硕士学位论文.
- 钱壮志,胡正国,刘继庆. 1998. 东昆仑北西向韧性剪切带发育的区域构造背景——以石灰沟韧性剪切带为例. 成都理工学院学报, 25(2): 201~205.
- 钱壮志,李厚民,胡正国. 1997. 青海五龙沟地区金矿控矿构造研究. 西安地质学院学报, 19(增刊): 27~32.
- 青海省地质矿产局. 1991. 青海省区域地质志. 北京: 地质出版社, 1~622.
- 石金友. 1997. 青海省都兰县五龙沟金矿成矿地质特征及找矿标志. 前寒武研究进展, 20(2): 29~36.
- 张德全,丰成友,李大新,徐文艺,阎升好,余洪全,童英俊,崔艳合. 2001. 柴北缘-东昆仑地区的造山型金矿床. 矿床地质, 20(2): 137~146.
- 张德全,王富春,余宏全,丰成友,李大新,李进文. 2007. 柴北缘-东昆仑地区造山型金矿床的三级控矿构造系统. 中国地质, 34(1): 92~99.
- 张金阳,马昌前,李建威. 2012. 东昆仑水闸东沟-黄龙沟金矿床硫化物矿物学特征对可见金形成条件的制约. 矿床地质, 31(6): 1184~1194.
- 张延斌,钟康惠,易桂花,马辉. 2009. 东昆仑五龙沟金矿集中区遥感地质信息提取与找矿预测. 地质与勘探, 45(4): 444~449.
- 张延林,韩玉,张培青,田承胜,陈建林. 2011. 东昆仑五龙沟金矿床Ⅱ号金矿化带特征及找矿前景. 黄金, 32(9): 9~15.
- 赵莹. 2014. 青海省五龙沟金矿床的矿床特征及成因浅析. 科技资讯, 11: 115~119.

Two Alteration Episodes of the Wulonggou Gold Ore Field in Qinghai Province and Its Prospecting Significance

HAN Yu¹⁾, CHEN Bailin²⁾, DENG Yuanliang¹⁾, CHEN Jianlin¹⁾,
WANG Yong²⁾, ZHANG Hao²⁾, WANG Tong²⁾, LI Shaonan¹⁾, LI Shaoping¹⁾

1) Qinghai No. 1 Academy of Geology and Mineral Exploration, Ping'an, Qinghai, 810600;

2) Institute of Geomechanics, CAGS, Beijing, 100081

Abstract

The Wulonggou gold ore field of Qinghai Province is an important gold ore-clustered area in the middle part of the eastern Kunlun orogenic belt. Gold deposits in the area are controlled mainly by three gold-bearing structural fracture zones (Yanjingou zone, Yinshigou-Hongqigou zone and Sandaoliang-Kushuiquan zone). This study shows two episodes of alteration and mineralization occurred in the ore field: the early-stage alteration controlled by linear faulting structure and related to gold mineralization, and the late-stage polymetallic mineralization and alteration related to disseminated sulfide-rich granitic complex. The gold deposits formed at the early stage were partly destroyed by the alteration and polymetallic mineralization related to disseminated sulfide rich granitic complex at the late stage. The future prospecting for gold deposit should be carried out along the trend of faulting tectonic zone, where there are no many crosscutting fractures, especially no disseminated sulfide rich granitic complex.

Key words: two alteration episodes; gold mineralization; polymetallic mineralization; prospecting for gold; Wulonggou gold ore-field; Qinghai Province